00054739

BOMBAY BRANCH
OF THE
ROYAL ASIATIC SOCIETY.
TOWN HALL, BOMBAY.

Digitized with financial assistance from
Observer Research Foundation
on 17 May, 2019

O
580.73
ZOT/Dre
54739

Amerikanische Gewächse

nach

Linneischer Ordnung.

Des zweiten Hunderts, erste Hälfte

von

Tab. 101. bis 150.

FXg13
54739

Nürnberg,
auf Kosten der Raspischen Buchhandlung.
1786.

EX CLASSE VIta.

Tab. 101.

Tillandſia lingulata. Lin. Gen. 428. Spec. 3. p. 8.
Zungenförmige Tillandſie. Lin. Pflanzenſ. 6 Th. S. 304.
a. Eine ausgehobene Blume.
b. Die Saamenkapſel.
Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 92.

Tab. 102.

Tillandſia tenuifolia. Linn. Gen. 428. Spec. 4. p. 8.
Schmalblättrichte Tillandſie. Linn. Pflanzenſyſt. 6 Th. S. 305.
Wächſt in Karthagena.
Noch ſo groß, als die Abbildung.
Tacquin Tab. 93.

Tab. 103.

Tillandſia polyſtachia. Linn. Gen. 428. Spec. 6. p. 9.
Vielährichte Tillandſie. Linn. Pflanzenſ. 6 Th. S. 306.
Wächſt in Havanah. Dreymal ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 94.

Tab. 104.

Tradeſcantia geniculata. Linn. Gen. 430. Spec. 4. p. 11.
Knotige Tradeſcantie. Linn. Pflanzenſ. 6 Th. S. 312.
Wächſt in Martinique.
Noch ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 95.

Tab. 105.

Haemanthus puniceus. Linn. Gen. 432. Spec. 3. p. 14.
Scharlachrothe Blutblume. Linn. Pflanzenſyſt. 11 Th. S. 131.
a. Eine ganze Blume.
b. Eben dieſe geöfnet mit den fünf Staubfäden.
c. Der Fruchtknoten, Griffel und ſtumpfe Narbe.
d. Die Beere.
e. Dieſe durchſchnitten.
f. Der Saame.
g. Der auswachſende Saame, aus welchem das Würzelchen
h. entſpringt, das eine neue Zwiebel
i. ernährt.
Wächſt in Guinea.
Trew. Tab. 44.

Tab. 106.

Pancratium illyricum. Linn. Gen. 437. Spec. 6. p. 22.

Illyriſche Gilgen. Linn. Pflanzenſyſt. II Th. S. 169.

Wächſt in Illyrien.

Trew. Tab. 27.

Tab. 107.

Pancratium amboinenſe. Linn. Gen. 437. Spec. 7. p. 23.

Amboiniſche Gilgen. Linn. Pflanzenſ. II Th. S. 169.

Wächſt in Amboina.

Trew. Tab. 28.

Tab. 108.

Pancratium littorale. Jacqu.

Pancraticum Spatha multiflora, ſcapo compreſſo, ancipiti, corollae laciniis, tubo duplo brevioribus, foliis enſiformibus. Gen. 437.

Ufer-Gilgen. Linn. Pflanzenſ. II Th. S. 165.

Wächſt in Tierra Bomba. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 101.

Tab. 109.

Pancratium declinatum. Jacqu.

Pancratium Spatha multiflora ancipiti, corollae laciniis tubum ſubexcedentibus, foliis lingulatis. Gen. 437.

Liegende Gilgen. Linn. Pflanzenſyſt. II Th. S. 168.

Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 102.

Tab. 110.

Crinum Zeylanicum. Linn. Gen. 438. Spec. 3. p. 24

Zeyloniſche Hakenlilie. Linn. Pflanzenſ. II Th. S. 176.

Wächſt in Oſtindien.

Trew. Tab. 13.

Tab. 111.

Amaryllis atamaſco. Linn. Gen. 439. Spec. 3. p. 25

Virginiſche Amaryllis. Linn. Pflanzenſ. II Th. S. 186.

a. Die länglichte, zweyſpaltige, aufgeſprungene Scheide.

b. b. Die ſechsblättrige Krone.

c. Die ſechs Staubfäden.

d. Der Fruchtknoten, gebogene Griffel und die dreytheilige Narbe.

e. Der

e. Der durchschnittene Fruchtknoten.

Wächst in Virginien.

Nach der Natur.

Tab. 112.

Amarillis belladonna. Linn. Gen. 439. Spec. 5. p. 26.

Schöne Frau. Linn. Pflanzensyst. 11 Th. S. 190.

a. Die ungeöfnete Scheide.

b. Die sechsblättrichte Krone, die drey äussern Blättgen mit einwärts gekehrten Spizen, deren eines

c. mit einem Staubfaden abgesondert ist.

d. Eines der drey innern Blättgen.

e. Die sechs Staubfäden.

f. Ein Staubbeutel.

g. Der Fruchtknoten geöfnet, mit dem gebogenen Griffel und der Narbe.

h. Die Saamenkapsel, dreyfächerig.

i. Diese durchschnitten.

k. Eben diese offen.

l. Saamen

m. die durchschnittene Zwiebel.

Wächst in Surinam ꝛc.

Miller illust. Tab. 18.

Tab. 113.

Yucca filamentosa. Linn. Gen. 463. Spec. 4. p. 84.

Fadige Yukke. Linn. Pflanzensyst. 3 Th. S. 381.

a. Eine ausgebreitete Blume fast in natürlicher Grösse, sonst sind sie halb geschlossen.

Wächst in Virginien.

Trew. Tab. 37.

Tab. 114.

Achras mammosa. Linn. Gen. 473. Spec. 1. p. 103.

Brüstenförmiger Breyapfel. Linn. Pflanzensyst. 1 Th. S. 423.

a. Eine Blume.

b. Die Frucht.

c. Der Saame.

d. Die Kerne.

Wächst in Karthagena, Kuba, Jamaika. Dreymal so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 59.

Tab. 115.

Achras Sapota. Linn. Gen. 473. Spec. 2. p. 104.

Gemeiner Breyapfel. Linn. Pflanzenf. 1 Th. S. 425.

a. a. Zeitige Früchte.

b. Saamen.

Wächst auf den Karibäen. Dreymal so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 60.

Tab. 116.

Burfera gummifera. Linn. Gen. 475. Spec. 1. p. 105.

Gummigebende Burfere. Linn. Pflanzenſ. 1 Th. S. 433.

a. Die Blüthe.

b. Die Frucht, in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Kuba, Domingo und Jamaika. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 96.

Tab. 117.

Loranthus uniflorus. Linn. Gen. 478. Spec. 2. p. 108.

Einblumige Riemenblume. Linn. Pflanzenſyſt. 3 Th. S. 389.

Wächſt in Domingo.

Jacquin Tab. 100.

Tab. 118.

Loranthus americanus. Linn. Gen. 478. Spec. 4. p. 108.

Amerikaniſche Riemenblume. Linn. Pflanzenſyſt. 3 Th. S. 390.

Wächſt in Martinique. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 98.

Tab. 119.

Loranthus ſpicatus. Lin. Gen. 478. Spec. 9. p. 109.

Aehrenförmige Riemenblume. Linn. Pflanzenſyſt. 3 Th. S. 390.

Wächſt in Karthagena. Die Hälfte gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 99.

Tab. 120.

Hillia paraſitica. Linn. Gen. 479. Spec. 1. p. 110.

Die ſchmarozende Hillie. Linn. Pflanzenſ. 3 Th. S. 395.

a. Der Fruchtknoten mit der ſechsblättrigten Blumendecke.

Wächſt in Martinique. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 97.

Tab. 121.

Peplis tetrandra. Linn. Gen. Spec. 2. p. 113.

Amerikaniſche Peplis. Linn. Pflanzenſ. 6 Th. S. 364.

Wächſt in Havanna.

Jacquin Tab. 103.

Tab.

Tab. 122.

Petiveria octandra. Lin. Gen. 482. Spec. 2. p. 131.
Achtfädige Petiverie. Linn. Pflanzenſ. 3 Th. S. 401.
Wächſt auf Martinique und den Karibäen. Dreymal ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 104.

EX CLASSE VIIIva.

Tab. 123.

Oenothera octovalvis. Linn. Gen. 505. Spec. 5. p. 148.
Achtſchaalige Nachtkerze. Linn. Pflanzenſ. 6 Th. S. 416.
Wächſt auf den Karibäen. Noch ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 105.

Tab. 124.

Melicocca bijuga. Linn. Gen. 514. Spec. 1. p. 157.
Melicocca mit zweypaarigen Blättern. Linn. Pflanzenſ. 1 Th. S. 466.
a. Blume, natürlich.
b. Dieſe vergröſſert.
c. Die Frucht.
d. Saamen – beede natürlich.
Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 109.

Tab. 125.

Amyris ſylvatica. Linn. Gen. 516. Spec. 2. p. 158.
Waldbalſamſtrauch. Linn. Pflanzenſ. 1 Th. S. 471.
Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 108.

Tab. 126.

Ximenia americana. Linn. Gen. 517. Spec. 1. p. 160.
Amerikaniſche Ximenie. Linn. Pflanzenſ. 1 Th. S. 453.
Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 107.

Tab. 127.

Coccolaba uvifera. Linn. Gen. 538. Spec. 1. p. 214.
Gemeine Seetraube. Linn. Pflanzenſ. 1 Th. S. 289.
a. Saamen.
b. Der Kern.
Wächſt auf den Karibäen. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.
Jacquin Tab. 110.

Tab.

Tab. 128.

Coccoloba excoriata. Linn. Gen. 538. Spec. 3. p. 215.

Rindenloſe Seetraube. Linn. Pflanzenſ. 1 Th. S. 494.

Wächſt in Domingo und Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 115. G

Tab. 129.

Coccoloba punctata. Linn. Gen, 538. Spec. 4.

Gedupfte Seetraube. Linn. Pflanzenſ. 1 Th. S. 495.

Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 114.

Tab. 130.

Coccoloba obtuſifolia. Jacquin.

Coccoloba foliis oblongis obtuſiſſimis. Gen. 538.

Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 111.

Tab. 131.

Coccoloba flaveſcens. Jacqu.

Coccoloba foliis lanceolato-oblongis, obtuſis mucronatis. Gen. 538.

Wächſt in Domingo. Nicht viel gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 112.

Tab. 132.

Coccoloba diverſifolia. Jacqu.

Coccoloba foliis ramuſculorum ovatis, ramorum ovato-cordatis. Gen. 538.

Wächſt in Domingo. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 113.

EX CLASSE IXna.

Tab. 133.

Caſſyta filiformis. Linn. Gen. 548. Spec. 1. p. 230.

Fadenförmige Caſſytha. Linn. Pflanzenſ. 6 Th. S. 469.

a. Die Frucht mit dem Mark durchſchnitten.

b. Saamen. Beyde in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Tierra bomba. Nicht viel gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 116.

Tab.

Tab. 134.

Caſſytha baccifera.

Caſſytha polyſperma. D. Solander.

a. Der dreyblättrige Kelch von oben.

b. Dieſer von der Seite auf dem Fruchtknoten.

c. Die dreyblättrige Krone mit den neun Staubfäden und dem Stempfel.

d. Alle dieſe Theile, nebſt dem Honigbehältniſſe, im Umriß.

e. Die Geſchlechtstheile ausgebreitet.

f. Der Fruchtknoten, dicke Griffel und dreiſpaltige ſtumpfe Narbe.

g. Die Frucht mit dem Kelch bekränzt.

h. Dieſe nach der Länge und

i. nach der Quere durchſchnitten.

k. Saamen.

Wächſt in Indien.

Eine vom D. Solander neu entdeckte Pflanze.

Miller Illuſt. Tab. 29.

EX CLASSE X.

Tab. 135.

Parkinſonia aculeata. Linn. Gen. 555. Spec. 2. p. 248.

Stachlichte Parkinſonie. Linn. Pflanzenſ. 1 Th. S. 563.

a. Saamen.

Wächſt in den Karibäen. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 119.

Tab. 136.

Poinciana pulcherrima. Linn. Gen. 557. Spec. 2. p. 258.

Schönſte Poinciane. Linn. Pflanzenſ. 3 Th. S. 528.

Wächſt in den Karibäen. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 120.

Tab. 137.

Trichilia trifoliata. Linn. Gen. 573. Spec. 2. p. 270.

Dreyblättrichte Trichilie. Linn. Pflanzenſ. 1 Th. S. 601.

a. Die ausgebreitete Kapſel.

b.b. Zween Saamen. Beide in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Curacao. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 119.

Tab. 138.

Zygophyllum arboreum. Linn. Gen. 577. Spec. 2. p. 248.

Baumartiges Doppelblatt. Linn. Pflanzenſyſt. 1 Th. S. 275.

Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 124.

Tab. 139.

Heiſteria coccinea. Linn. Gen. 586. Spec. 2. p. 283.

Scharlachrothe Heiſterie. Linn. Pflanzenſ. 3 Th. S. 544.

Wächſt auf Martinique und den Karibäen. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 122.

Tab. 140.

Melaſtoma diſcolor. Linn. Gen. 589. Spec. 10. p. 287.

Buntblättrichter Schwarzmund. Linn. Pflanzenſyſt. 1 Th. S. 629.

Wächſt in Martinique. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 125.

Tab. 141.

Samyda parviflora. Linn. Gen. 609. Spec. 1. p. 301.

Kleinblümige Samyda. Linn. Pflanzenſ. 3 Th. S. 581.

Wächſt in Martinique.

Jacquin Tab. 127.

Tab. 142.

Samyda nitida. Linn. Gen. 600. Spec. 2. p. 302.

Glänzende Samyda. Linn. Pflanzenſ. 3 Th. S. 582.

a. Der aufgeſchnittene Kelch. mit den acht Staubfäden und dem Honigbehältniß.

Wächſt in Karthagena. Nicht viel gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 126.

Tab.

Tab. 143.

Erythroxylon areolatum. Linn. Gen. 625. Spec. 1. p. 374.
Karthaginenſiſches Rothholz. Linn. Pflanzenſyſt. 1 Th. S. 653.

a. Die ganze Frucht.
b. Die entzwey geſchnittene Nuß.

Wächſt in Karthagena. Nicht viel gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 129.

Tab. 144.

Erythroxylon havanenſe. Linn. Gen. 725. Spec. 2. p. 374.
Havaniſches Rothholz. Linn. Pflanzenſ. 1 Th. S. 655.

Wächſt in Havana. Nicht viel gröſſer als die Abbildung.

Jacquin Tab 130.

Tab. 145.

Spondias Myrobolanus. Linn. Gen. 726. Spec. 2. p. 374.
Myrobalanen Baum. Linn. Pflanzenſ. 1 Th. S. 664.

a. Die Frucht.
b. Die Nuß.
c. Dieſe durchſchnitten. Alle in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in den Karibäen, Karthagena ꝛc. Die Hälfte ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 131.

Tab. 146.

Myroſpermum fruteſcens. Jacq.

a. Die Frucht.
b. Saamen. Beyde in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 118.

EX CLASSE XIma.

Tab. 147.

Triumfetta Bartramia. Linn. Gen. 655. Spec. 2. p. 420.
Bartramiſche Triumfette. Linn. Pflanzenſ. 7 Th. S. 5.

Wächſt in Martinique. Die Hälfte gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 137.

Tab. 148.

Triumfetta ſemitriloba. Linn. Gen. 655. Spec. 3. p. 420.
Halbdreylappichte Triumfette. Linn. Pflanzenſ. 7 Th. S. 6.

a. Die Frucht, in natürlicher Gröſſe.

Jacquin Tab. 133.

Tab.

Tab. 149.

Portulaca triangularis. Linn. Gen. 659. Spec. 5. p. 425.

Dreyeckichter Portulack. Linn. Pflanzenſ. 6 Th. S. 11.

Wächſt in den Karibäen.

Jacquin Tab. 135.

Tab. 150.

Portulaca patens. Linn. Gen. 659. Spec. 7. p. 425.

Riſpenförmiger Portulack. Pflanzenſ. 7 Th. S. 12.

Wächſt in Martinique und Domingo. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 136.

Tillandsia lingulata. L.

Tillandsia tenuifolia. L.

Tillandsia polystachia. L.

Tradeſcantia geniculata. L.

Hæmanthus puniceus. L.

Pancratium illyricum. L.

Pancratium Amboinenſe. L.

Pancratium littorale. ♃.

Pancratium declinatum. J.

Crinum Zeylanicum. L.

Amaryllis atamaſco. L.

Amaryllis belladōna. L.

Yucca filamentoſa. L.

Achras mammosa. L.

Crassula coccinea. L.

Bursera Gumifera. L.

Loranthus uniflorus. L.

Loranthus americanus. L.

Loranthus spicatus. L.

Hillia parasitica. L.

Peplis tetrandra. L.

Petiveria octandra. L.

Oenothera octovalvis. L.

c

d

a

b

Melicocca bijuga. L.

Amyris sylvatica L.

Ximenia americana. L.

Coccolaba uvifera L.

Coccolaba excoriata. L.

54739

Coccolaba punctata. L.

Coccolaba obtusifolia. J.

Coccolaba flavescens. J.

Coccoloba diversifolia. J.



Cassyta filiformis. L.

Cassyta baccifera

Parkinsonia aculeata. L.

Poinciana pulcherrima L.

Trichilia trifoliata. L.

Zÿgophÿllum arboreum. L.

Huisteria coccinea. L.

Melastoma discolor. L.

Samyda parviflora L:

Samyda nitida. L.

Erythroxylon areolatum. L.

Erythroxylon havanense L.

a

b

c

Spondias mirobalanus. L.

Myrospermum frutescens. J.

Triumfetta bartramia. L.

Triumfetta semitriloba L.

Portulaca triangularis. L.

Portulaca patens. L.

Amerikaniſche
Gewächſe
nach
Linneiſcher Ordnung.

Des zweiten Hunderts zwote Hälfte
von
Tab. 151. bis 200.

Nürnberg,
auf Koſten der Raſpiſchen Buchhandlung.
1787.

Tab. 151.

Ginora americana. Linn. Gen. 661. Spec. 1. p. 449.
Die americaniſche Ginore. Linne Pflanzenſyſt. 3 Th. S. 618.
Wächſt in Cuba. Nicht viel gröſſer, als die Abbildung.
Jacquin Tab. 137.

Tab. 152.

Euphorbia tithymaloides. Linn. Gen. 763. Spec. 11. p. 438.
Myrtenblätrichte Euphorbie. Linne Pflanzenſyſt. 7 Th. S. 44.
a. Die Blätter ſind viermal gröſſer, als hier.
b. Die Blüthe in natürlicher Gröſſe.
Wächſt in den Karibäen.
Jacquin Tab. 138.

Tab. 153.

Euphorbia graminea. Linn. Gen. 665. Spec. 27. p. 443.
Grasigte Euphorbie. Linne Pflanzenſ. 7 Th. S. 55.
a. Eine vergröſſerte Blume.
Wächſt in Karthagena.
Die Hälfte gröſſer, als die Abbildung.
Jacquin Tab. 139.

Tab. 154.

Cactus flagelliformis. Linn. Gen. 668. Spec. 14. p. 468.
Rankenförmige Fackeldiſtel. Linne Pflanzenſyſt. 3 Th. S. 631.
a. Die ganze Blume.
b. Dieſe nach der Länge durchſchnitten.
c. c. Der Kelch mit haarigten Schuppen.
d. Die vielen Staubfäden, in deren Mitten
e. der viel kürzere Stempfel.
f. Die vergröſſerte Narbe mit dem Befruchtungsſtaub.
g. Ein vergröſſerter Staubbeutel.
h. Die unzeitige Frucht.
i. Die zeitige Frucht, in natürlicher Gröſſe.
k. Dieſe durchſchnitten mit den Saamen.
l. Saamen.
m. Dieſer vergröſſert.
n. Ein Stück des Hauptſtengels.
Wächſt im mittäglichen Amerika.
Trew Tab. 30.

Tab. 155.

Psidium pyriferum. Linn. Gen. 670. Spec. 1. p. 473.
Birntragender Cujavabaum. Linne Pflanzensyst. 1 Th. S. 699.
a. Die Frucht.
b. Diese durchschnitten.
c. Saamen.
Wächst in Indien.
Trew. Tab. 43.

Tab. 156.

Eugenia pseudo-psidium. Linn. Gen. 671. Spec. 3. p. 475.
Bastard Cujavabaum. Linne Pflanzens. 1 Th. S. 709.
a. Saamen in natürlicher Grösse.
Wächst in Martinique.
Noch so groß, als die Abbildung.
Jacquin Tab. 140.

Teb. 157.

Chrysobalanus icaco. Linn. Gen. 677. Spec. 1. p. 490.
Cocopflaumen. Linne Pflanzensyst. 1 Th. S. 756.
Wächst in den Karibäen.
Noch so groß, als die Abbildung.
Jacquin Tab. 141.

Tab. 158.

Sesuvium portulacastrum. Linn. Gen. 680. Spec. 1. p. 496.
Portulacartiges Sesuvium. Linne Pflanzensyst. 7 Th. S. 96.
Wächst in den Karibäen.
Noch so groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 142.

Tab. 159.

Mesembryanthemum noctiflorum. Linn. Gen. 684. Sp. 5. p. 506.
Nachtzaserblume. Linne Pflanzens. 7 Th. S. 102.
a. Der halbvierspaltige Kelch.
b. Die einblätrige, vieltheilige Krone.
c. Eben diese geöfnet.
d. Die zahlreichen Staubfäden, im Kelch eingefügt.
e. Ein Staubfaden.
f. Der stumpf viereckigte Fruchtknoten, mit den vier Griffeln, und einfachen Narben.
Wächßt auf dem Vorgebürge der guten Hofnung.
Nach der Natur.

Tab.

EX CLASSE XIIIa.

Tab. 160.

Maregrafia umbellata. Linn. Gen. 696. Spec. 1. p. 562.
Doldentragende Maregravie. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 1.
a. Die Frucht in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in den Karibäen. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab 143.

Tab. 161.

Capparis frondoſa. Linn. Gen. 699. Spec. 4. p. 564.
Buſchichte Kappern. Linne Pflanzenſyſt. 4 Th. S. 6.
a. Die Frucht in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena und Domingo. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 153.

Tab. 162.

Capparis ferruginea. Linn. Gen. 699. Spec. 5. p. 564.
Octandra Jacquin.
Roſtfärbige Kappern. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 7.

Wächſt in Domingo. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 149.

Tab. 163.

Capparis cynophallophora. Lin. Gen. 699 Spec. 7. p. 565.
Langſchottigte Kappern. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 9.
a. Die Frucht.
b. Ein Querſchnitt derſelben. Beide in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in den Karibäen und in Venezuela. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 145.

Tab. 164. 165.

Capparis pulcherrima. Linn. Gen. 699. Spec. 8. p. 565.
Schönſte Kappern. Linne Pflanzenſyſt. 4 Th. S. 11.
a. Die Frucht.
b. Saamen. Beide in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena. Zwey und ein halbmal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 155.

Tab. 166.

Capparis linearis. Linn. Gen. 699. Spec. 9. p. 566.
Schmalblätterichte Kappern. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 12.

Wächſt in Karthagena und Venezuela. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 151.

Tab. 167.

Capparis Breynia. Linn. Gen. 699. Spec. 10. p. 566.

Breynie. Linne Pflanzenſyſt. 4 Th. S. 12.

Wächſt in den Karibäen. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 152.

Tab. 168.

Capparis haſtata. Linn. Gen. 699. Spec. 11. p. 566.

Spaadonblätterichte Kappern. Linn. Pflanzenſ. 4 Th. S. 13.

Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 147.

Tab. 169.

Capparis euſtachiana. Jacquin.
Capparis pedunculis multifloris, foliis ovatis, acuminatis, utrinque nitidis, fructibus glabris. Gen. 699.

Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 146.

Tab. 170.

Capparis verrucoſa. Jacquin.
Capparis pedunculis multifloris, foliis oblongis, acutis utrinque nitidis, fructu verrucoſo. Gen. 699.

a. Die Frucht in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena. Um die Hälfte gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 148.

Tab. 171.

Capparis Jamaicenſis. Jacquin.
Capparis pedunculis multifloris, foliis oblongis, emarginatis, ſubtus tomentoſis, corollis ſemierectis. Gen. 699.

Wächſt in Jamaika. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 150.

Tab. 172.

Capparis tenuiſiliqua. Jacquin.
Capparis racemis ſimplicibus, erectis, fructibus, ſiliquoſis, foliis deciduis. Gen. 699.

a. Die Frucht.

b. Saamen. Beede in natürlicher Gröſſe.

c. Ein Hauptblatt, iſt in der Natur dreymal gröſſer.

Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 154.

Tab.

Tab. 173.

Capparis nemoroſa. Jacquin.

Capparis floribus racemoſis, foliis acuminatis, fructu baccato. Gen. 699.

Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 156.

Tab. 174.

Muntingia calabura. Linn. Gen. 707. Spec. I. p. 576.

Calabura. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 15.

Wächſt in Domingo. Dreymal gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 158.

Tab. 175.

Sarracenia flava. Linn. Gen 708. Spec. I. p. 577.

Gelbe Sarracenie. Linne Pflanzenſyſt. 7 Th. S. 210.

a. Die gedoppelte Blumendecke.
b. Ein Blättgen der kleinen dreyblätrichten.
c. Ein Blatt der groſſen fünf blätterichten.
d. Die fünfblätterige Krone.
e. Ein Kronblatt.
f. Die zalreichen Staubfäden.
g. Ein abgeſonderter.
h. Der Fruchtknoten mit dem walzenförmigen Griffel und der ſchildförmigen fünfeckigten Narbe.
i. Die Saamenkapſel.
k. Dieſe Queer durchſchnitten.
l. Die fünffächerige Saamenkapſel aufgeſprungen.
m. Ein Fach derſelben.
n. Saamen.

Wächſt im mitternächtlichen Amerika.

Miller Illuſtr. Tab. 46.

Tab. 176.

Mammea americana. Linn. Gen. 713. Spec. I. p. 581.

Amerikaniſcher Mammeybaum. Linne Pflanzenſ. 2 Th. S. 16.

a. Die Blume.
b. Der Saamen. Beide in natürlicher Gröſſe.
c. Die Frucht.

Wächſt in den Karibäen. Viermal ſo groß, als die Abbildung.

Tab. 177.

Calophyllum calaba. Linn. Gen. 716. Spec. 2. p. 583.
Kleines Schönblatt. Linne Pflanzenſ. 2 Th. S. 28.
a. Die Frucht.
b. Die Nuß. Beide in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 249.

Tab. 178.

Laetia apetala. Linn. Gen. 718. Spec. 1. p. 585.
Unvollkommene Laetie. Linne Pflanzenſ. 2 Th. S. 37.
a. Die Frucht. In natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 159.

Tab. 179. 180.

Lecythis minor. Linn. Gen. 720. Spec. 2. p. 586.
Kleiner Topfbaum. Linne Pflanzenſ. 2 Th. S. 45.
a. Das Honigbehältniß ausgebreitet, trägt unten die Staubfäden, und iſt für den Fruchtknoten durchbohrt. Oben ſtehen gelbe Haare, welche eingebogen ſind und die Geſchlechtstheile überdecken.
b. Die Frucht, den Deckel auf beiden Seiten zeigend.
c. Saamen.
d. Die Frucht ſelbſt, mit abgehobenem Deckel und ausgenommenem Saamen. Alle drey Stücke in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 160.

Tab. 181.

Corchorus hirſutus. Lin. Gen. 730. Spec. 6. p. 607.
Zotiger Corchorus. Linne Pflanzenſyſt. 7 Th. S. 215.

Wächſt in Havana und Curakao. Etwas gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 157.

Tab. 182. 183.

Poeonia tenuifolia. Linn. Gen. 732. Spec. 3. p. 610.
Schmalblätterichte Pöonie. Lin. Pflanzenſ. 7 Th. S. 248.
a. Der Kelch, fünfblätterigt, deren eines ſich öfters in ein Kronblatt
α. endigt.
b. Die

b. Die achtblättrige Krone.
c. Die sehr zahlreichen Staubfäden.
β. Ein vergrösserter.
d. Die drey Fruchtknoten, mit purpurfarbenen Haaren besezt, nebst den drey länglichten Narben.
e. Ein Fruchtknoten nach der Länge durchschnitten.
f. Saamen.

Wächst in der Ukraine und in Siebenbürgen.

Nach der Natur.

Tab. 184.

Aquilegia canadenſis. Lin. Gen. 741. Spec. 4. p. 620.
Canadiſche Akeley. Lin. Pflanzenſ. 7 Th. S. 270.

a. Die fünfblättrige Krone.
b. Diese fünf Blätter ohne die Honigbehältniſſe.
c. Die fünf Honigbehältniſſe.
d. Eines derſelben abgeſondert.
e. Dieſes geöfnet.
f. Die vielen Staubfäden.
g. Ein abgeſonderter.
h. Fünf kürzere Staubfäden, die mit einer Haut zuſammenhängen, und die übrigen Staubfäden umgeben.
i. Die acht Fruchtknoten mit den pfriemenförmigen Griffeln und kaum merklichen Narben.
k. Ein abgeſonderter.

Wächst in Kanada, Virginien ꝛc.

Nach der Natur.

Tab. 185. 186.

Magnolia grandiflora. Linn. Gen. 748. Spec. 1. p. 625.
Grosblumige Magnolie. Linne Pflanzenſyſt. 2 Th. S. 75.

a. Blüthenknoſpe.
b. Die Hülle mit der noch eingeſchloſſenen Knoſpe.
c. Die unaufgeblühte Knoſpe, noch mit der Scheide bedekt.
d. Dieſe in gröſſerm Wachsthum, mit aufgeſprungener Scheide.
e. Das Ende des Zweigs, auf welchem die Blume ſizt, nebſt einem Stük eines Blattſtiels.
f. Die abgeſonderte Scheide.
g. Der gänzlich entblößte Blumenknopf.
h. Der Fruchtknoten, mit den vielen Stempfeln. Unten in
i. iſt die Axe, um welche die zalreichen Staubfäden ſtehen, deren einer an

k. von innen, mit den, der Länge nach, an den Seiten angewachsenen Staubbeuteln, und an
l. von aussen abgebildet ist.
m. Die zeitige Frucht mit den vielen Kapseln, und einigen noch feststzenden zeitigen Beeren.
n. Die an Fäden aus der Oefnung der Schuppen herunterhängenden Beere oder Saamen.
o. Eine abgesonderte schon aufgesprungene Schuppe, mit der Beere.
p. Eine solche, mit der herunterhangenden Beere, und dem noch bleibenden Griffel.
q. Saamen von beiden Seiten.

Wächst in Florida und Karolina.

Trew Tab. 35.

Tab. 187.

Annona muricata. Linn. Gen. 751. Spec. 1. p. 628.
Zackigter Flaschenbaum. Linne Pflanzensyst. 2 Th. S. 89.
a. Der Stempfel nach abgefallenen Blättern und Staubfäden.
b. Die Frucht.

Wächst in den Karibäen. Dreymal so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 161.

Tab. 188. 189.

Annona squamosa. Linn. Gen. 751. Spec. 2. p. 629.
Schuppichter Flaschenbaum. Linne Pflanzensyst. 2 Th. S. 95.
a. Die ausgebreitete Blume.
b. Die Frucht.
c. Saamen. Alle drey in natürlicher Grösse.

Wächst in den Karibäen. Dreymal so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 162.

EX CLASSE XIVta.

Tab. 190.

Teucrium cubense. Linn. Gen. 764. Spec. 18. p. 17.
Westindischer Gamander. Lin. Pflanzensyst. 2 Th. S. 360.

Wächst in Cuba. Dreymal so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 164.

Tab.

Tab. 191.

Ballota ſuaveolens. Linn. Gen. 778. Spec. 4. p. 63.
Wohlriechende Ballote. Linne Pflanzenſ. 7 Th. S. 488.
a. Die Blume vergröſſert.
b. Dieſe von der Seite.
c. Der Kelch natürlich.
Wächſt in den Karibäen. Noch ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 163.

Tab. 192.

Scutellaria havanenſis. Linn. Gen. 792. Spec. 10. p. 99.
Havaniſches Helmkraut. Linne Pflanzenſyſt. 7 Th. S. 573.
Wächſt in Havana. Noch ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 165.

Tab. 193.

Craniolaria annua. Linn. Gen. 810. Spec. 2. p. 141.
Jährige Schädelnuß. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 49.
a. Die Saamenkapſel.
b. Dieſe queer durchſchnitten. Beide in natürlicher Gröſſe.
Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.
Jacquin Tab. 166.

Tab. 194.

Besleria criſtata. Linn. Gen. 813. Spec. 3. p. 144.
Hahnenkammartige Beßlerie. Lin. Pflanzenſ. 4 Th. S. 56.
Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 180.

Tab. 195.

Bignonia paniculata. Linn. Gen. 817. Spec. 5. p. 156.
Riſpentragende Bignonie. Linn. Pflanzenſ. 4 Th. S. 60.
a. Die Saamenkapſel.
b. Saamen. Beide in natürlicher Gröſſe.
Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.
Jacquin Tab. 175.

Tab. 196.

Bignonia ſtans. Linn. Gen. 817. Spec. 14. p. 195.
Aufrechte Bignonie. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 64.
Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.
Jacquin Tab. 176.

Tab. 197.

Cytharexylum cinereum. Linn. Gen. 760. Spec. 1. p. 160.
Aſchgrauer Geigenholzbaum. Lin. Pflanzenſ. 2 Th. S. 119.

a. Die Blüthe.
b. Saamen von beyden Seiten. Beyde in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Martinique. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 178.

Tab. 198.

Creſcentia Cujete. Linn. Gen. 820. Spec. 1. p. 161.
Der Cujete. Linne Pflanzenſyſt. 2 Th. S. 126.

Wächſt in den Karibäen. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 197.

Tab. 199.

Petrea volubilis. Linn. Gen. 822. Spec. 1. p. 163.
Windenartige Petree. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 64.

Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 173.

Tab. 200.

Capraria-biflora. Linn. Gen. 827. Spec. 1. p. 168.
Zweyblumige Herzblume. Lin. Pflanzenſyſt. 4 Th. S. 79.

a. Ein im Schatten ausgewachſenes Blatt, in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in den Karibäen. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 174.

Ginora americana. L.

Euphorbia tithymaloides. L.



Euphorbia graminea. L.



Cactus flagelliformis. L.

Pſidium pyriferum. L.

Eugenia pseudo-psidium. L.

Chrysobolanus icaco. L.

Sesuvium portulacastrum. L.

Mesembryanthemum noctiflorum. L.

Marcgravia umbellata. L.

Capparis frondosa. L.

Capparis ferruginea. L.

Capparis cynophal lophora L.

Capparis pulcherrima. L.

Capparis pulcherrima L.

Capparis linearis L.

Capparis Breynia. L.

Capparis hastata L.

Capparis eustachiana. F.

Capparis verrucosa. F.

Capparis Jamaicensis. J.

Capparis tenuisiliqua. J.

Capparis nemorosa. J.

Muntingia calabura. L.

Sarracenia flava. L.

Mamea americana. L.

Calophyllum calaba. L.

Lactia apetala. L.

Lecythis minor L.

Lecythis minor. L

Corchorus hirsutus. L.

Poeonia tenuifolia. L.



Poeonia tenuifolia L.

Aquilegia canadensis. L.

Magnolia grandiflora L.



Magnolia grandiflora. L.

Annona muricata. L.

Annona squamosa. L.



Annona squamosa. L.

Teucrium cubense. L.

Ballota suaveolens. L.

Scutellaria havanensis. L.

Craniolaria annua L.

Besleria cristata. L.



Bignonia paniculata. L.

Bignonia stans: L.

Citharexylum cinereum. L.

Crescentia cujete. L.

Petraea volubilis. L.

Vogel fe.

Capraria biflora. L.

00054739

Digitized with financial assistance from
Observer Research Foundation
on 17 May, 2019